

---

# Dávkovací plán pre dieťa

## Ako lieky bezpečne užívať

Vek: 4 roky Hmotnosť: 16 kg Dočasná liečba: 7 dní

## Ako jednotlivé prípravky podať

- MEDOCLAV: 5 ml o 08:00 a 20:00. Pred dávkou fľašu dôkladne pretrepte, odmerajte priloženou striekačkou a podajte na začiatku jedla alebo tesne pred ním.
- Mometasone Sandoz: 1 vstreky do každej nosovej dierky o 08:00 a 20:00. Sprej pretrepte, dieťa nech sa jemne vysmrká; trysku smerujte mierne von od nosovej prepážky a nie do očí.
- UNIFLOX 0,3 %: 1 kvapka do každej nosovej dierky ráno, popoludní a večer počas 7 dní. Do nosa používajte iba podľa výslovného pokynu lekára; liek je registrovaný na očné/ušné použitie. Hrotom sa nedotýkajte nosa.
- Sinupret: 15 kvapiek o 08:00, 14:00 a 20:00. Pred použitím pretrepte, pri kvapkaní držte fľašu zvislo; možno podať s trochou tekutiny, pri citlivom žalúdku po jedle.
- Dr. Max ProbioMaxik: 1 žuvacia tableta o 14:00; možno rozhrýzť, cmúľať alebo nechať rozpustiť v ústach. Trvanie tento plán neurčuje.

## Ak sa dávka vynechá

- MEDOCLAV: podajte po spomenutí a pred ďalšou dávkou počkajte približne 4 hodiny. Nedávajte dvojnásobnú dávku.
- Mometasone Sandoz alebo UNIFLOX: použite po spomenutí a potom pokračujte v obvyklom režime; dávku nezdvojujte. Sinupret: vynechanú dávku nezdvojujte a pokračujte ďalšou plánovanou dávkou.

## Kedy vyhľadať pomoc

- Okamžite: sťažené dýchanie, opuch tváre/pier/jazyka/hrdla alebo rýchlo sa šíriaca žihľavka - možné príznaky závažnej alergickej reakcie.
- Urgentne kontaktujte lekára: opuch alebo výrazné začervenanie okolia oka, bolesť oka, zhoršené či dvojité videnie, výrazné zhoršenie celkového stavu alebo nezvyčajne silná bolesť hlavy.
- Pri silnej, pretrvávajúcej alebo krvavej hnačke počas MEDOCLAVu kontaktujte lekára. Pri výraznom alebo opakovanom krvácaní z nosa počas nosovej liečby tiež kontaktujte lekára.

## Uchovávanie a praktické opatrenia

- MEDOCLAV po nariadení: chladnička 2-8 °C, spotrebovať do 7 dní; pred každou dávkou pretrepať. Striekačku po použití opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.
- ProbioMaxik: v suchu a tme pri 5-25 °C, chrániť pred vlhkom. Všetky prípravky uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

*Tento plán nenahrádza písomnú informáciu pre používateľa ani pokyny lekára. Dávky ani dĺžku liečby svojvoľne nemeňte. MEDOCLAV podávajte počas celých schválených 7 dní, aj keď sa dieťa cíti lepšie.*

# Dávkovací rozpis

## Dočasná liečba - 7 dní

UNIFLOX nemá v tomto pláne určené presné hodiny; podáva sa ráno, popoludní a večer podľa pokynu lekára.

| Čas                         | Čo podať                                                                                                                                                                                       | Ako podať / poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08:00<br/>RÁNO</b>       | MEDOCLAV 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml - 5 ml<br>Mometasone Sandoz 50 mikrogramov - 1 vstrek do každej nosovej dierky<br>Sinupret - 15 kvapiek<br>UNIFLOX 0,3 % - 1 kvapka do každej nosovej dierky | MEDOCLAV: pretrepať, odmerať striekačkou, podať na začiatku jedla/tesne pred ním.<br>Mometasone: pretrepať, po jemnom vysmrkaní, smerovať mierne od prepážky.<br>Sinupret: pretrepať, kvapkať zvislo; pri citlivom žalúdku po jedle.<br>UNIFLOX: do nosa iba podľa výslovného pokynu lekára; ráno bez určenej presnej hodiny. |
| <b>14:00<br/>POPOLUDNIE</b> | Sinupret - 15 kvapiek<br>Dr. Max ProbioMaxik - 1 žuvacia tableta<br>UNIFLOX 0,3 % - 1 kvapka do každej nosovej dierky                                                                          | Sinupret: ústami, podľa potreby s trochou tekutiny.<br>ProbioMaxik: rozhrýzť, cmúľať alebo nechať rozpustiť; trvanie nie je týmto plánom určené.<br>UNIFLOX: popoludňajšia dávka, presná hodina neurčená.                                                                                                                     |
| <b>20:00<br/>VEČER</b>      | MEDOCLAV 400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml - 5 ml<br>Mometasone Sandoz 50 mikrogramov - 1 vstrek do každej nosovej dierky<br>Sinupret - 15 kvapiek<br>UNIFLOX 0,3 % - 1 kvapka do každej nosovej dierky | MEDOCLAV: pretrepať, odmerať striekačkou, podať na začiatku jedla/tesne pred ním.<br>Mometasone: pretrepať, po jemnom vysmrkaní, smerovať mierne od prepážky.<br>Sinupret: ústami; pri citlivom žalúdku po jedle.<br>UNIFLOX: večerná dávka, presná hodina neurčená.                                                          |

## Pomôcka na zaznamenanie užitia

Opakovane použiteľná pomôcka: na príslušný riadok položte premiestniteľnú magnetku alebo opakovane použiteľnú nálepku. Ak je plán v ochrannnej fólii, možno použiť stierateľný popisovač. Na začiatku ďalšieho dňa značky zotrite alebo presuňte späť.

RÁNO / 08:00 miesto pre vratnú značku \_\_\_\_\_

POPOLUDNIE / 14:00 miesto pre vratnú značku \_\_\_\_\_

VEČER / 20:00 miesto pre vratnú značku \_\_\_\_\_

Ak si nie ste istí, či už bola dávka podaná, nepodávajte automaticky ďalšiu dávku navyše. Overte postup s lekárnikom alebo lekárom.